

## Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

### **KLAVOBEL BID 875 mg/125 mg filmom obložene tablete**

*amoksicilin, klavulanska kiselina*

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne informacije.**

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

#### **Što se nalazi u ovoj uputi:**

1. Što je KLAVOBEL BID i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati KLAVOBEL BID
3. Kako uzimati KLAVOBEL BID
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati KLAVOBEL BID
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

#### **1. Što je KLAVOBEL BID i za što se koristi**

KLAVOBEL BID je antibiotik koji uništava bakterije koje uzrokuju infekciju. Sadrži dva različita lijeka koji se zovu amoksicilin i klavulanska kiselina. Amoksicilin pripada skupini lijekova koje zovemo penicilini. Djelovanje penicilina ponekad može biti zaustavljeno (postanu inaktivni) pa druga djelatna komponenta lijeka KLAVOBEL BID (klavulanska kiselina) sprječava da se tako nešto dogodi.

KLAVOBEL BID namijenjen je liječenju sljedećih infekcija u odraslih i djece:

- infekcije sinusa i srednjeg uha
- infekcije dišnih putova
- infekcije mokraćnih putova
- infekcije kože i mekih tkiva uključujući infekcije zubi i desni.
- infekcije kostiju i zglobova.

#### **2. Što morate znati prije nego počnete uzimati KLAVOBEL BID**

##### **Nemojte uzimati KLAVOBEL BID:**

- ako ste alergični na djelatne tvari (amoksicilin, klavulansku kiselinu), penicilin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- ako ste ikad imali tešku alergijsku reakciju (reakciju preosjetljivosti) na bilo koji drugi antibiotik. Ovo može uključivati kožni osip, ili oteklinu lica ili vrata.
- ako ste imali žuticu ili poremećaj funkcije jetre tijekom prethodne primjene antibiotika.

**Ako se nešto od navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati KLAVOBEL BID. Ukoliko niste sigurni, razgovarajte s Vašim liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja lijeka KLAVOBEL BID.**

### **Upozorenja i mjere opreza**

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete KLAVOBEL BID.

Budite oprezni s KLAVOBEL BID tabletama:

- ako imate poremećaj funkcije jetre ili bubrega
- ako bolujete od infektivne mononukleoze (imate vrućicu s otečenim limfnim čvorovima)
- ako ne mokrite redovito.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili, pak, niste sigurni, javite se svom liječniku.

U nekim slučajevima Vaš liječnik može ispitati vrstu bakterije koja uzrokuje infekciju. Ovisno o rezultatima, može Vam propisati drugu dozu ili drugi lijek.

### **Stanja koja zahtijevaju poseban oprez**

KLAVOBEL BID može pogoršati određena stanja ili uzrokovati ozbiljne nuspojave. To uključuje alergijske reakcije, konvulzije (epileptičke napade) i upalu debelog crijeva. Kako bi smanjili rizik nastanka ovih stanja, obratite pažnju na određene simptome tijekom uzimanja lijeka KLAVOBEL BID. Pogledajte "*Stanja na koja trebate obratiti pažnju*" u **dijelu 4. Moguće nuspojave.**

### **Pretrage krvi i urina**

Ako radite neke krvne pretrage (kao što je broj crvenih krvnih stanica ili testovi funkcije jetre - jetrene probe) ili pretrage urina (na glukozu), recite liječniku ili medicinskoj sestri da uzimate KLAVOBEL BID. Razlog tome je što KLAVOBEL BID može utjecati na rezultate ovih tipova pretraga.

### **Drugi lijekovi i KLAVOBEL BID**

Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste kupili bez recepta kao i biljne lijekove. Ukoliko ste zaprimljeni u bolnicu, obavijestite nadležnog liječnika da uzimate KLAVOBEL BID kao i o bilo kojim drugim lijekovima koje uzimate.

Prije primjene lijeka KLAVOBEL BID obavijestite liječnika ako uzimate bilo koji od niže navedenih lijekova:

- probenecid i alopurinol (lijekovi za liječenje uloga ili gihta).  
Istodobna primjena ovih lijekova s lijekom KLAVOBEL BID može povećati vjerojatnost da dobijete kožnu alergijsku reakciju
- lijekove protiv zgrušavanja krvi (npr. varfarin).  
Ako uzimate KLAVOBEL BID istodobno s lijekovima protiv zgrušavanja krvi možda će biti potrebno provesti dodatne pretrage krvi.
- metotreksat (lijek za liječenje raka ili reumatskih bolesti). KLAVOBEL BID može utjecati na izlučivanje metotreksata iz organizma.
- mofetilmikofenolat (lijek za sprječavanje odbacivanja presađenih organa). KLAVOBEL BID može utjecati na djelovanje mofetilmikofenolata.

### **KLAVOBEL BID s hranom i pićem**

KLAVOBEL BID se preporučuje uzimati na početku obroka zbog smanjene mogućnosti nastanka nuspojava povezanih s probavnim sustavom i bolje apsorpcije (pogledajte dio **4. Moguće nuspojave**).

### **Trudnoća, dojenje i plodnost**

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

### **Upravljanje vozilima i strojevima**

KLAVOBEL BID može imati nuspojave i simptome koji mogu utjecati na Vašu sposobnost vožnje. Nemojte voziti ili upravljati strojevima ukoliko se ne osjećate dobro.

## **3. Kako uzimati KLAVOBEL BID**

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

### **Odrasli i djeca tjelesne mase 40 kg i više**

Uobičajena doza je 1 tableta dva puta dnevno.

Viša doza je 1 tableta tri puta dnevno.

### **Djeca tjelesne mase manje od 40 kg**

Djecu dobi 6 godina i manje trebalo bi liječiti oralnom suspenzijom. Upitajte svog liječnika ili ljekarnika ukoliko trebate lijek dati djetetu tjelesne mase manje od 40 kg.

Tablete nisu prikladne za djecu tjelesne mase manje od 25 kg.

### **Bolesnici s oštećenjem funkcije bubrega i/ili jetre**

Ako imate problema s bubrezima, liječnik će Vam možda promijeniti dozu ili preporučiti drugi lijek.

Ako imate problema s jetrom, možda će biti potrebno češće provesti neke krvne pretrage kako bi se provjerio rad jetre.

### **Ako uzmete više KLAVOBEL BID tableta nego što ste trebali**

Ako uzmete više KLAVOBEL BID tableta nego što ste trebali, mogu se pojaviti želučane tegobe (mučnina, povraćanje ili proljev) ili epileptički napadi. Obratite se svom liječniku ili u najbližu zdravstvenu ustanovu. Sa sobom ponesite i ovu uputu kako bi zdravstveno osoblje znalo koji ste lijek uzeli.

### **Ako ste zaboravili uzeti KLAVOBEL BID**

Ako zaboravite uzeti dozu lijeka, uzmite je odmah čim se sjetite. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Nikad nemojte uzeti dvije doze u razmaku manjem od 4 sata.

### **Ako prestanete uzimati KLAVOBEL BID**

Važno je da popijete cijelu količinu KLAVOBEL BID tableta koju Vam je liječnik propisao. Nemojte ih prestati uzimati čak i ako se osjećate bolje jer lijek možda još nije uništio sve bakterije pa Vam se stanje može ponovno pogoršati.

**U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.**

#### **4. Moguće nuspojave**

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

##### **Stanja na koja trebate obratiti pažnju**

###### **- Alergijske reakcije:**

- kožni osip
- upala krvnih žila (vaskulitis) koja može biti vidljiva u obliku crvenih ili purpurnih uzdignutih točkica na koži, ali može zahvatiti i ostale dijelove tijela
- vrućica, bolovi u zglobovima, otečeni limfni čvorovi na vratu, pod pazuhom ili preponama
- otekline, povremeno lica ili usta (angioedem), koje uzrokuju poteškoće u disanju
- nesvjestica.

**Odmah se obratite liječniku** ako razvijete neke od ovih simptoma. **Prestanite uzimati KLAVOBEL BID.**

###### **- Upala debelog crijeva:**

Upala debelog crijeva uzrok je vodenastog proljeva, uobičajeno praćenog krvlju i sluzi, boli u trbuhu i/ili vrućicom.

**Obratite se liječniku što prije** za savjet ako razvijete neke od ovih simptoma.

Tijekom liječenja KLAVOBEL BID tabletama mogu se javiti i sljedeće nuspojave:

##### **Vrlo česte nuspojave** (javljaju se u više od 1 na 10 bolesnika)

- proljev (u odraslih).

##### **Česte nuspojave** (javljaju se u do 1 na 10 bolesnika)

- gljivična infekcija u ustima, rodnici ili na kožnim naborima (*candida albicans*)
- mučnina, posebice ako uzimate visoke doze (ako se to odnosi na Vas, uzimajte KLAVOBEL BID prije obroka)
- povraćanje
- proljev (kod djece).

##### **Manje česte nuspojave** (javljaju se u do 1 na 100 bolesnika)

- kožni osip, svrbež
- kožni osip s uzdignutim promjenama i svrbežom (koprivnjača)
- omaglica, glavobolja
- probavne tegobe
- povišene vrijednosti jetrenih enzima.

##### **Rijetke nuspojave** (javljaju se u do 1 na 1000 bolesnika)

- kožni osip koji može imati mjehuriće i izgleda kao male mete (središnja tamna točka, okružena svjetlijim krugom te s tamnim prstenom na rubu - *erythema multiforme*). **Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma, hitno se obratite liječniku.**

- smanjen broj bijelih krvnih stanica (leukocita/neutrofila) i krvnih pločica (trombocita).

### **Ostale nuspojave**

Ostale nuspojave zabilježene su kod vrlo malog broja ljudi, no točna učestalost njihovog pojavljivanja nije utvrđena.

- alergijske reakcije (pogledajte gore)
- upala debelog crijeva (pogledajte gore)
- upala moždane ovojnice (aseptični meningitis)
- ozbiljne kožne reakcije
  - široko rasprostranjeni osip s mjehurićima i ljuskama na koži, posebno oko usta, nosa, očiju i spolovila (*Stevens-Johnsonov sindrom*), kao i teži oblik koji uzrokuje obilno ljuštenje kože (više od 30% površine kože - *toksična epidermalna nekroliza*)
  - široko rasprostranjeni crveni kožni osip s malim gnojnim mjehurićima (*bulozni ekfolijativni dermatitis*)
  - crveni, ljuskasti osip, s potkožnim izbočinama i mjehurićima (*exanthemous pustulosis*)
  - simptomi nalik gripi s osipom, vrućicom, natečenim žlijezdama te odstupanjem u rezultatima krvnih pretraga (uključujući povećani broj krvnih stanica (eozinofilija) i jetrenih enzima) (Reakcija na lijek s eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS)).

#### **Odmah se javite liječniku ukoliko razvijete neke od navedenih simptoma.**

- upala jetre (hepatitis)
- žutica uzrokovana porastom vrijednosti bilirubina u krvi (tvar koju proizvodi jetra) zbog čega koža i bjeloočnice poprime žutu boju
- upala cjevčica (tubula) u bubrezima
- produženo vrijeme zgrušavanja krvi
- hiperaktivnost
- epileptički napadi (kod ljudi koji uzimaju visoke doze lijeka KLAVOBEL BID ili koji imaju problema s bubrezima)
- crni jezik koji izgleda dlakavo
- obojenost zubi (kod djece) koja se obično uklanja četkanjem zubi.

Nuspojave koje se mogu manifestirati pri krvnim i mokraćnim pretragama:

- ozbiljno smanjenje broja bijelih krvnih stanica
- smanjeni broj crvenih krvnih stanica (*hemolitička anemija*)
- kristali u urinu.

### **Prijavljivanje nuspojava**

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Internetska stranica: [www.halmed.hr](http://www.halmed.hr) ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

## **5. Kako čuvati KLAVOBEL BID**

KLAVOBEL BID čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvajte u originalnom pakiranju.

KLAVOBEL BID se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Nikad nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

## **6. Sadržaj pakiranja i druge informacije**

### **Što sadrži KLAVOBEL BID**

Djelatne tvari su amoksisicilin i klavulanska kiselina.

Jedna filmom obložena tableta sadrži 875 mg amoksisicilina u obliku amoksisicilin trihidrata i 125 mg klavulanske kiseline u obliku kalijevog klavulanata.

Pomoćne tvari su:

Tabletna jezgra: celuloza, mikrokristalična; natrijev škroboglikolat, vrste A; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijev stearat.

Film ovojnica: hipromeloza; boja titanijev dioksid (E171); makrogol.

### **Kako KLAVOBEL BID tableta izgleda i sadržaj pakiranja**

Bijela, duguljasta, filmom obložena tableta s oznakom „A“ na jednoj strani i oznakom „6“ i „5“ na drugoj strani između kojih se nalazi urez. Urez služi samo kako bi se olakšalo lomljenje tablete radi lakšeg gutanja, a ne da bi se podijelila na jednake doze.

14 (2 x 7) tableta u oPA/Al/PVC//Al blisteru, u kutiji.

### **Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač**

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica, Hrvatska

### **Način i mjesto izdavanja lijeka**

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

**Ova uputa je zadnji puta revidirana u rujnu 2017.**

**Pripremio za raspodjelu:**

Žgombić Rukavina Iva , Stručni suradnik , 08.09.2017.

**Odobrio za raspodjelu:**

Žilić Hrvoje , Stručni suradnik , 08.09.2017.

Jurković Sven , Stručni suradnik , 08.09.2017.

Metzner Iva , Stručni suradnik , 08.09.2017.