

UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJA ZA KORISNIKA

LACIDIPIN BELUPO 4 mg filmom obložene tablete LACIDIPIN BELUPO 6 mg filmom obložene tablete *lacidipin*

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što su LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete i za što se koriste
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete
3. Kako uzimati LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. ŠTO SU LACIDIPIN BELUPO FILMOM OBLOŽENE TABLETE I ZA ŠTO SE KORISTE

LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete su namijenjene liječenju visokog krvnog tlaka. Ubrajaju se u skupinu lijekova pod nazivom blokatori kalcijevih kanala. LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete djeluju tako da proširuju krvne žile što olakšava protjecanje krvi i snižava krvni tlak.

2. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LACIDIPIN BELUPO FILMOM OBLOŽENE TABLETE

Nemojte uzimati LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete:

- ako ste preosjetljivi (alergični) na lacidipin, neki drugi lijek iz skupine blokatora kalcijevih kanala ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka
- ako imate bolest srca koja se naziva stenoza aorte (suženje zaliska koje otežava otjecanje krvi iz srca)
- ako ste unutar zadnjih mjesec dana preboljeli srčani udar
- ako osjetite bol u prsima (simptom angine pektoris), ubrzani, slabi puls, niski krvni tlak ili Vam disanje postane ubrzano i plitko, koža hladna i ljepljiva, a usne pomodne ili ako osjetite omaglicu, nesvjesticu ili slabost - morate prekinuti uzimanje lijeka i javiti se liječniku.

Ukoliko se bilo što od navedenog odnosi na Vas, nemojte primjenjivati ovaj lijek. Ukoliko niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas, javite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Budite posebno oprezni s LACIDIPIN BELUPO filmom obloženim tabletama

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika prije uzimanja LACIDIPIN BELUPO filmom obloženih tableta:

- ako ste nedavno preboljeli srčani udar
- ako imate nepravilan rad srca ili bilo koje druge probleme sa srcem
- ako bolujete od neke bolesti jetre.

Ukoliko niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas, javite se svom liječniku ili ljekarniku.

Laboratorijske pretrage

Ako ste upućeni na pretrage krvi, recite osobi koja obavlja tu pretragu da uzimate LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete jer ovaj lijek može utjecati na nalaze nekih pretraga jetrene funkcije.

Drugi lijekovi i LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako ste nedavno uzeli bilo koji lijek, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta, kao i biljne lijekove. LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete mogu utjecati na učinkovitost nekih lijekova. Neki lijekovi mogu utjecati na učinkovitost LACIDIPIN BELUPO filmom obloženih tableta.

Recite svom liječniku ili ljekarniku ako uzimate neke od sljedećih lijekova:

- lijekove za liječenje visokog krvnog tlaka
- lijekove za kontrolu srčanog ritma
- lijekove za liječenje depresije (npr. tricikličke antidepresive)
- lijekove za spavanje ili smirenje
- antibiotike
- antihistaminike - za liječenje peludne groznice ili drugih alergija
- cimetidin - za liječenje želučanih problema
- kortikosteroide.

LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete s pićem

Nemojte piti sok od grejpa dok uzimate LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Nema podataka o sigurnosti primjene LACIDIPIN BELUPO filmom obloženih tableta u trudnica. Ako ste trudni, mislite da bi mogli biti trudni ili planirate trudnoću, **ne smijete uzimati** LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete prije nego se posavjetujete sa svojim liječnikom. Vaš će liječnik procijeniti eventualni rizik i korist primjene ovog lijeka za Vas i Vaše dijete.

Sastojci LACIDIPIN BELUPO filmom obloženih tableta mogu se izlučivati u mlijeko. Ovaj lijek se smije koristiti tijekom dojenja samo ako je moguća dobrobit za majku veća od mogućeg rizika za dijete.

Upravljanje vozilima i strojevima

LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete mogu izazvati omaglicu i tako smanjiti Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete sadrže laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. KAKO UZIMATI LACIDIPIN BELUPO FILMOM OBLOŽENE TABLETE

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Liječenje obično započinje s dozom od 2 mg lacidipina (pola tablete od 4 mg) jedanput na dan, ujutro. Nakon 3-4 tjedna možda će Vaš liječnik odlučiti povisiti dozu na 4 mg jednom dnevno, ujutro. Ako je neophodno, doza se može povećati na 6 mg svakoga jutra, što je i najveća preporučena dnevna doza.

LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete treba uzimati u isto vrijeme svakoga dana, najbolje ujutro.

LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete treba progutati s čašom vode, neovisno o obroku.

Nemojte žvakati tablete.

Nemojte uzimati sok od grejpa tijekom liječenja.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno kako Vam je liječnik propisao. Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Ako uzmete više LACIDIPIN BELUPO filmom obloženih tableta nego što ste trebali

Ako uzmete veću dozu od preporučene, odmah se javite svom liječniku ili se javite najbližoj hitnoj medicinskoj službi. Ponesite sa sobom tablete ili uputu o lijeku kako bi zdravstveni djelatnici znali koji ste lijek uzeli. Kao posljedice predoziranja mogu se javiti pad krvnog tlaka te ubrzani ili usporeni puls.

Ako ste zaboravili uzeti LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete

Ako ste zaboravili uzeti uobičajenu dozu lijeka ujutro, uzmite je čim se sjetite toga dana. Međutim, ako se sjetite tek sljedeći dan, uzmite svoju uobičajenu dozu toga jutra. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete

Uzimajte lijek dokle god Vam to propisuje liječnik. Nemojte prekinuti uzimanje lijeka osim ako Vam to savjetuje Vaš liječnik.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom LACIDIPIN BELUPO filmom obloženih tableta, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Ovdje navedene nuspojave LACIDIPIN BELUPO filmom obloženih tableta mogu biti česte, manje česte, rijetke ili vrlo rijetke.

Česte nuspojave (javljaju se u najviše 1 na 10 bolesnika):

- omaglica, glavobolja
- ubrzano ili nepravilno lupanje srca (palpitacije)
- crvenilo lica, oticanje (osobito u području gležnja).

Ove nuspojave obično nestaju u nastavku liječenja.

- ubrzani rad srca
- želučane tegobe, mučnina
- kožni osip, crvenilo i svrbež
- učestalo mokrenje
- osjećaj slabosti
- promjene u laboratorijskim nalazima funkcije jetre.

Manje česte nuspojave (javljaju se u najviše 1 na 100 bolesnika):

- bol u prsima (simptom angine pektoris), uključujući i bol u prsima koja se pogoršava. Odmah recite svom liječniku ako imate ovu ozbiljnu nuspojavu jer će Vam možda biti potrebno hitno liječenje.
- pad krvnog tlaka uz nesvjesticu ili gubitak svijesti
- otok zubnog mesa.

Rijetke nuspojave (javljaju se u najviše 1 na 1000 bolesnika):

- ozbiljna alergijska reakcija s oticanjem lica, usana, jezika ili grla, što može otežavati disanje. Odmah recite svom liječniku ako imate ovu ozbiljnu nuspojavu jer će Vam možda biti potrebno hitno liječenje.
- pojava koprivnjače (urtikarije - uzdignutog osipa na koži koji svrbi).

Vrlo rijetke nuspojave (javljaju se u najviše 1 na 10 000 bolesnika):

- drhtavica
- depresija.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Internetska stranica: www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. KAKO ČUVATI LACIDIPIN BELUPO FILMOM OBLOŽENE TABLETE

LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete morate čuvati izvan pogleda i dohvata djece. Ovaj lijek čuvajte u originalnom spremniku, zaštićeno od svjetla.

LACIDIPIN BELUPO 4 mg ili 6 mg filmom obložene tablete se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Ne vadite lijek iz blistera dok niste spremni uzeti LACIDIPIN BELUPO.

LACIDIPIN BELUPO 4 mg filmom obložena tableta ima razdjelni urez koji omogućava lomljenje tablete na dva dijela pri čemu se osigurava da jedna polovica tablete sadrži 2 mg.

Ako uzimate polovicu tablete od 4 mg, drugu polovicu čuvajte u izvornom pakiranju te uzmite unutar 48 sati.

Lijekovi se ne smiju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte ljekarnika kako odlagati lijekove koje više ne trebate. Ove mjere će pomoći u zaštiti okoliša.

6. SADRŽAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE

Što LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete sadrže

Djelatna tvar je lacidipin.

Jedna filmom obložena tableta sadrži 4 mg odnosno 6 mg lacidipina.

Pomoćne tvari su:

Tabletna jezgra:

laktoza, bezvodna, povidon, magnezijev stearat.

Film ovojnica:

hipromeloza, talk, propilenglikol, titanijev dioksid (E171).

Kako LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete izgledaju i sadržaj pakiranja

LACIDIPIN BELUPO 4 mg: bijela, ovalna, bikonveksna, filmom obložena tableta s razdjelnim urezom na jednoj strani.

Razdjelni urez omogućava lomljenje tablete na dva dijela, pri čemu se osigurava da svaka polovica tablete sadrži jednake doze.

LACIDIPIN BELUPO 6 mg: bijela, ovalna, bikonveksna, filmom obložena tableta s oznakom „6 mg“ na jednoj strani.

28 (7 x 4) tableta u oPA/Al/PVC//Al blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji put revidirana u ožujku 2015.

Pripremio za raspodjelu:

Erlač Marko , Pripravnik , 25.09.2017.

Odobrio za raspodjelu:

Lovrić Marija , Viši stručni suradnik , 25.09.2017.

Gučevac Tamara-Gina , Stručni suradnik , 25.09.2017.

Matek Irena , Specijalist , 25.09.2017.