

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

LUPOCET 500 mg filmom obložene tablete *paracetamol*

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što su LUPOCET 500 mg filmom obložene tablete i za što se koriste
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati LUPOCET 500 mg filmom obložene tablete
3. Kako uzimati LUPOCET 500 mg filmom obložene tablete
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati LUPOCET 500 mg filmom obložene tablete
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su LUPOCET 500 mg filmom obložene tablete i za što se koriste

LUPOCET filmom obložene tablete sadrže paracetamol.

Koriste se za ublažavanje boli i za snižavanje povišene tjelesne temperature.

LUPOCET filmom obložene tablete ne nadražuju želučanu sluznicu pa ih mogu uzimati i osobe sa želučanim tegobama, odnosno čirom na želucu ili dvanaesniku.

Tablete su ovalnog oblika pa se lakše mogu progutati. Zbog filmske ovojnice nemaju neugodan okus.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati LUPOCET 500 mg filmom obložene tablete **Nemojte uzimati LUPOCET 500 mg filmom obložene tablete:**

- ako ste alergični na paracetamol ili na neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
- LUPOCET 500 mg filmom obložene tablete **ne smiju se primjenjivati** u djece mlađe od 4 godine.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete LUPOCET 500 mg filmom obložene tablete:

- ako imate problema s bubrezima i/ili jetrom
- ako imate oštećenu jetru zbog pretjerane konzumacije alkoholnih pića
- ako istodobno uzimate druge lijekove koji sadrže paracetamol (odmah **prekinite** njihovu primjenu jer se ne smiju koristiti zajedno s LUPOCET 500 mg filmom obloženim tabletama, vidjeti dio **Drugi lijekovi i LUPOCET 500 mg filmom obložene tablete**).

Obavijestite svog liječnika ako bol usprkos primjeni LUPOCET 500 mg filmom obloženih tableta traje dulje vrijeme.

U slučaju predoziranja potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć, čak i ako nemate nikakve simptome (vidjeti dio **Ako uzmete više LUPOCET 500 mg filmom obloženih tableta nego što ste trebali**). Naime, postoji rizik za kasniju pojavu teškog oštećenja jetre.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili, pak, niste sigurni, javite se svom liječniku.

Djeca i adolescenti

LUPOCET 500 mg filmom obložene tablete **ne smiju se primjenjivati** u djece mlađe od 4 godine.

Drugi lijekovi i LUPOCET 500 mg filmom obložene tablete

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli, ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove uključujući i one koje ste kupili bez recepta. Ovo se odnosi i na biljne lijekove i homeopatske pripravke.

Tijekom primjene LUPOCET 500 mg filmom obloženih tableta **nemojte uzimati** neki drugi lijek koji sadrži paracetamol.

Ako uzimate neke od sljedećih lijekova, savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije primjene LUPOCET 500 mg filmom obloženih tableta:

- metoklopramid ili domperidon (lijekovi protiv mučnine i povraćanja)
- kolestiramin (lijek za snižavanje kolesterola u krvi, za ublažavanje svrbeža i proljeva u nekim bolestima probavnog sustava)
- probenecid (lijek za liječenje gihta)
- zidovudin (lijek za liječenje infekcije HIV-om)
- antikoagulans (lijek koji sprječava zgrušavanje krvi).

LUPOCET 500 mg filmom obložene tablete s hranom, pićem i alkoholom

LUPOCET 500 mg filmom obložene tablete možete uzimati neovisno o obroku.

Ne preporučuje se konzumacija alkoholnih pića tijekom terapije LUPOCET 500 mg filmom obloženih tableta.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ako ste trudni ili dojite, možete uzimati LUPOCET 500 mg filmom obložene tablete uz preporuku liječnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

LUPOCET 500 mg filmom obložene tablete ne utječu na sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

LUPOCET 500 mg filmom obložene tablete sadrže laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati LUPOCET 500 mg filmom obložene tablete

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Pridržavajte se preporučenog doziranja.

Preporučene doze u odraslih i djece ne smiju se uzimati u razmacima manjima od 4 sata.

LUPOCET 500 mg filmom obložena tableta ima razdjelni urez koji omogućava lomljenje tablete na dva dijela pri čemu se osigurava da jedna polovica tablete sadrži 250 mg.

Odrasli (uključujući starije osobe) i adolescenti stariji od 12 godina

1-2 tablete po potrebi, u razmacima od najmanje 4 sata. Ne više od 8 tableta na dan.

Djeca u dobi od 11-12 godina (tjelesne mase od 32-43 kg)

1 tableta po potrebi, u razmacima od najmanje 4 sata. Ne više od 4 tablete na dan.

Djeca u dobi od 8-11 godina (tjelesne mase od 26-31 kg)

1/2 tablete po potrebi, u razmacima od najmanje 4 sata. Ne više od 3 tablete na dan.

Djeca u dobi od 6-8 godina (tjelesne mase od 21-25 kg)

1/2 tablete po potrebi, u razmacima od najmanje 4 sata. Ne više od 2 i 1/2 tablete na dan.

Djeca u dobi od 4-6 godina (tjelesne mase od 17-20 kg)

1/2 tablete po potrebi, u razmacima od najmanje 4 sata. Ne više od 2 tablete na dan.

Djeca mlađa od 4 godine

Ne preporučuje se primjena ovog lijeka u djece mlađe od 4 godine. Međutim, postoje odgovarajuće jačine doze odnosno oblici lijeka prikladni za ovu dobnu skupinu.

Ako uzmete više LUPOCET 500 mg filmom obloženih tableta nego što ste trebali

Odmah se javite najbližoj hitnoj pomoći ili o tome obavijestite svog liječnika ili ljekarnika. Uzmite preostale tablete ili uputu o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste se obratili znali točno koji ste lijek uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti LUPOCET 500 mg filmom obložene tablete

Ako ste propustili jednu dozu LUPOCET 500 mg filmom obloženih tableta, u slučaju da je i dalje prisutna vrućica ili bol uzmite sljedeću dozu lijeka. Vremenski razmak između doza ne smije biti manji od 4 sata. Nemojte uzeti dvostruku dozu lijeka odjednom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom LUPOCET 500 mg filmom obloženih tableta, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Uz terapijsku dozu lijeka nuspojave su općenito rijetke.

Prestanite uzimati lijek i odmah obavijestite liječnika ako primijetite ili sumnjate na sljedeće nuspojave:

- alergijske reakcije koje mogu biti i težeg oblika kao što je kožni osip i svrbež, ponekad kao oticanje usnica i lica ili kao pojava kratkog daha
- kožni osip ili ljuštenje kože, čirevi u ustima
- tegobe s disanjem (vjerojatnost da se pojavi ovakva reakcija je veća ako ste prethodno na isti način reagirali pri primjeni nekog drugog lijeka protiv boli, npr. ibuprofen, acetilsalicilatna kiselina)
- neobjašnjiva pojava modrica ili krvarenja
- mučnina, iznenadni gubitak tjelesne mase, gubitak apetita, žuto obojene bjeloočnice i koža.

Vrlo rijetko prijavljeni su slučajevi ozbiljnih kožnih reakcija.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Internetska stranica: www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati LUPOCET 500 mg filmom obložene tablete

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvati u originalnom pakiranju.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što LUPOCET 500 mg filmom obložene tablete sadrže

Djelatna tvar je paracetamol.

Jedna filmom obložena tableta sadrži 500 mg paracetamola.

Pomoćne tvari su:

Tabletna jezgra: škrob, prethodno geliran; povidon; kukuruzni škrob; talk (E553b); stearatna kiselina.

Film ovojnica: hipromeloza (E464); titanijev dioksid (E171); laktoza hidrat; makrogol; triacetin (E1518); karnauba vosak (E903).

Kako LUPOCET 500 mg filmom obložene tablete izgledaju i sadržaj pakiranja

Bijele, ovalne, bikonveksne tablete s razdjelnom crtom na jednoj strani.

Tableta se može razdijeliti na jednake polovice.

18 (2 x 9) tableta u PVC//Al blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u lipnju 2015.

Pripremio za raspodjelu:

Erlač Marko , Pripravnik , 25.09.2017.

Odobrio za raspodjelu:

Gučevac Tamara-Gina , Stručni suradnik , 25.09.2017.

Matek Irena , Specijalist , 25.09.2017.

Božić Matea , Stručni suradnik , 25.09.2017.